

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам

протокол от «30» октября 2020 г № 111

## ИНСТРУКЦИЯ

### по применению ветеринарного препарата «Ко-тризол»

#### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Ко-тризол (Co-trizolum).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: сульфаметоксазол, триметоприм.

Лекарственная форма: супензия для орального применения.

1.2 Препарат представляет собой супензию от белого до светло-бежевого цвета.

1.3 В 1,0 мл препарата содержится 400 мг сульфаметоксазола, 80 мг триметопrima, вспомогательные вещества (натрий гидроксид, повидон, вода очищенная).

1.4 Препарат выпускают в полимерной таре по 0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 20,0; 25,0 и 250,0 л.

1.5 Препарат хранят в упаковке изготовителя по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°C до плюс 25°C.

1.6 Срок годности – 3 (три) года от даты изготовления при соблюдении условий хранения. После вскрытия упаковки препарат необходимо использовать до конца срока годности.

1.7 Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

#### 2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Ко-тризол относится к группе комбинированных антибактериальных препаратов. Синергетическое взаимодействие сульфаметоксазола и триметопrima, входящих в состав препарата, обеспечивает высокую эффективность и широкий спектр бактерицидной активности в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе *Haemophilus influenzae suis*, *Haemophilus gallinarum*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Avibacterium paragallinarum*, *Corynebacterium spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Proteus vulgaris*, *Yersinia spp.*, *Clostridium spp.*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Chlamydia spp.*, *Actinomyces spp.*, *Listeria monocytogenes* микроорганизмов со средним уровнем чувствительность включая *Mycobacterium spp.*, *Nocardia spp.*, *Rickettsia spp.*, *Leptospira spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Mycoplasma spp.*, а также некоторых простейших, таких как *Coccidia* и *Toxoplasma gondii*.

2.2 Входящий в состав препарата сульфаметоксазол, сходный по строению с парааминобензойной кислотой, нарушает синтез дигидрофолиевой кислоты в бактериальных клетках, препятствуя включению парааминобензойной кислоты в ее молекулу. Триметоприм усиливает действие сульфамонометоксина, нарушая восстановление дигидрофолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую – активную форму фолиевой кислоты, ответственную за белковый обмен и деление микробной клетки. При комбинированном действии нарушается синтез фолиевой кислоты на двух последовательных стадиях, что приводит к нарушению синтеза нуклеотидов и обуславливает синергидное бактерицидное действие комбинации сульфаметоксазола и триметоприма.

2.3 Препарат быстро и полностью всасывается после перорального применения, достигая максимума концентраций действующих веществ в сыворотке крови уже через 1 час. Триметоприм отличается хорошим проникновением в клетки и через тканевые барьеры – в лёгкие, почки, желчь, слону, мокроту. Связывание триметоприма с белками 50 %, период полувыведения его колеблется от 8,6 до 17 час. Основной путь выведения триметоприма – через почки, 50 % в неизмененном виде. Сульфаметоксазол: связывание его с белками плазмы 66 %, период полувыведения от 9 до 11 час в норме. Основной путь элиминации – почки.

#### 3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Препарат применяют цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку птиц при пастереллезе, гемофиллезе, колибактериозе, сальмонеллезе, стафиллококкозе, эймериозе; молодняку крупного рогатого скота при колисептициемии, сальмонеллезе, пастереллезе, бронхопневмонии, абсцессах, вызванных стафилококками, полиартритах, вызванных стрептококками; свиньям при колибактериозе, атрофическом рините, сальмонеллезе, пастереллезе, гемофилезной плевропневмонии.

3.2 Ко-тризол применяют перорально с водой для поения индивидуально или групповым способом на протяжении 3-5 дней в суточной дозе:

- молодняку крупного рогатого скота и свиньям – 1 мл препарата на 15 кг массы животного;
- птице в возрасте 0-14 дней – 170 мл/тонну воды;
- птице в возрасте 15 дней и старше – 200 мл/тонну воды.

3.3 В период лечения животные и птица должна получать только воду, содержащую лекарственный препарат.

3.4 Лечебный раствор готовят ежедневно из расчета суточной потребности животных и птицы в воде. Перед применением препарат необходимо тщательно взболтать.

3.5 Следует избегать пропуска введения очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют как можно скорее в той же дозировке и по той же схеме.

3.6 При использовании препарата согласно инструкции по применению побочных явлений и осложнений не установлено.

3.7 Препарат можно применять беременным и лактирующим свиноматкам, а также птице, предназначенной для воспроизведения.

3.8 Препарат запрещено применять птице, чье яйцо используется в пищу людям, взрослым жвачным животным с развитым рубцовым пищеварением.

3.9 Противопоказанием к применению Ко-тризола является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата и наличие нарушений функции почек и/или печени.

3.10 Не допускается одновременное применение препарата с парааминонензойной кислотой, прокайном и другими местными анестетиками, а также с витаминами группы В (никотинамид, фолиевая кислота, холин) из-за их антагонистического действия на сульфаниламиды.

3.11 Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 10 суток, свиней и молодняка крупного рогатого скота – через 14 суток. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, могут быть использованы для кормления плотоядных животных.

#### **4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ**

4.1 При работе с Ко-тризолом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

#### **5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ**

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил применения препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная 19А) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

#### **6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

6.1 «Адисан Лабораториз ПВТ. ЛТД.» (Индия, Плот №.17, С №. 297, АТ Р. Амбервет, НИА Амбервет Датта Мандир, Тал-Малши, Дист-, Пьюн-412115, Тал: Малши, Дист: Пуне-Зон4 («Adisan Laboratories PVT LTD», India, PLOT NO. 17, S. NO. 297, AT R. AMBERVET, NEAR AMBERVET DATTA MANDIR, TAL -MULSHI, DIST -, PUNE - 412115, Dist - PUNE-ZONE4) для ООО НПК «Фарминдустрия» (Россия, 143960, М.О., г. Реутов, ул. Фабричная, д.7, литер B, помещение 9, этаж 3).

Инструкция по применению препарата разработана сотрудниками РУП "Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского" (И. И. Кузьминский, Е. А. Степанова), Adisan Laboratories PVT. LTD и ООО НПК «Фарминдустрия» (Васиф Сафаров).

Департамент ветеринарного и продовольственного  
надзора Министерства сельского хозяйства и  
продовольствия Республики Беларусь

Совет по ветеринарным препаратам

ОДОБРЕНО

Председатель \_\_\_\_\_

Секретарь \_\_\_\_\_

Эксперт \_\_\_\_\_

«30» 10.2020. протокол № 111